

Caltrac ZB

Vloeibare calcium meststof met borium en zink

Productsoort	EG-Meststof
Type aanduiding	Mengsel van sporelementen borium (B), zink Zn) en bevat ook calcium (CaO)
Fysische toestand	Vloeistof, suspensieconcentraat
Samenstelling	0,2% borium, 3 g/l B + 1,8% zink, 31 g/l Zn. Bevat ook 32,4% calcium, 559 g/l CaO
Soortelijk gewicht	1,72 kg/l
Kleur	Gebroken wit
pH	8,5
UN nummer	Geen
Transportgevarenklasse(n)	Geen
Opslag	Vorstvrij
Verpakking	10 liter

Yara Vita Caltrac ZB is een vloeibare bladmeststof met borium (B) en zink (Zn) en een zeer hoog gehalte aan calcium (een veelvoud van de hoeveelheid calcium in producten op nitraat- of chloridebasis). De flowable formulering zorgt voor een uitstekende opname (beter dan die van calciumzouten), waardoor we het calciumgehalte in o.a. aardappelen en bollen verhogen.

Voordelen

- ✓ Verhoogt het calciumgehalte in de plant als geen ander
- ✓ Lange werkingsduur
- ✓ Zorgt voor calciumgehalte in vruchten

Advies

Zie tabel op volgende pagina

Advies

Aardappel	Calciumgebrek / beperking inwendig bruin / betere kieming pootgoed bij de nateelt / bewaarkwaliteit	5 l/ha aan het begin van de knolzetting + 2 l/ha na 14 dagen voor onderhoud + 2 l/ha na 14 dagen voor onderhoud
Aardbei	Stevigheid / bewaarkwaliteit	2 l/ha tweewekelijks vanaf 100% vruchtzetting tot 4 weken voor de oogst.
Appel	Goede start calciumprogramma	5 l/ha in de periode vanaf bloei tot junirui. Eventueel na 14 dagen herhalen.
	Stevigheid / bewaarkwaliteit / voorkomen van stip	2 l/ha tweewekelijks vanaf junirui tot 4 weken voor de oogst.
Bessen	Stevigheid / bewaarkwaliteit	2 l/ha tweewekelijks vanaf 100% vruchtzetting tot 4 weken voor de oogst.
Bladgroenten / kool	Voorkomen van rand / stevigheid / opbrengst	4 l/ha vanaf 6- bladstadium. Eventueel na 14 dagen herhalen
Bloembollen	Verhogen calciumgehalte in de bol / beperken calciumgebrek bloementeelt	3 x 3 l/ha. Eén week voor bloei/koppen + na 14 dagen + na 14 dagen.
Peer	Stevigheid / bewaarkwaliteit / voorkomen van stip	2 x 2 l/ha vanaf junirui
Steenfruit	Stevigheid / bewaarkwaliteit / voldoende calcium bij aanvang	5 l/ha bij de val van het bloemblad. Voor de latere bespuitingen wordt Seniphos geadviseerd. Eventueel kan extra calcium worden gegeven met 2 l/ha Caltrac ZB.
Wortelen	Calciumgebrek / inwendige kwaliteit	4 l/ha zodra wortels enkele cm lang zijn. Eventueel na 14 dagen herhalen.