

# Lebosol Borium

**Vloeibare bladmeststof met Borium, ook geschikt voor de biologische teelt**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Productsoort               | Meststof                              |
| Type aanduiding            | Boorethanolamine                      |
| Fysische toestand          | Vloeistof                             |
| Samenstelling              | 11% water oplosbare borium, 150 g/l B |
| Soortelijk gewicht         | 1,36 kg/l                             |
| Kleur                      | Groen                                 |
| pH                         | 7,9 – 8,1                             |
| UN nummer                  | Geen                                  |
| Transportgevaarenklasse(n) | Geen                                  |
| Opslag                     | tussen -5 °C en 35 °C                 |
| Verpakking                 | 10 liter                              |

Lebosol Borium mag in Nederland en België worden gebruikt in de biologische landbouw. Lebosol Borium is een vloeibare bladmeststof op basis van borium ethanolamine. Het zorgt ervoor dat enzymen worden aangemaakt die de celdeling regelen en is daarmee dus belangrijk voor de ontwikkeling van jonge planten.

## Voordelen

- ✓ Toepasbaar in de biologische teelt
- ✓ Stimuleert de ontwikkeling van groeipunten
- ✓ Mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen

## Advies

|                    |                                                                       |                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle gewassen      | boriumgebrek                                                          | 0,5 - 3 l/ha spuiten in 200-400 liter water.                                                                 |
| Granen             | korrelzetting / eiwitgehalte                                          | 1-2 x 0,5-1 l/ha vanaf 3-bladstadium tot eerste knoop                                                        |
| Aardappelen        | inw. knolkwaliteit / calciumtransport                                 | 1-2x 1 l/ha bij sluiten van de rijen.                                                                        |
| Maïs               | kiemvorming na bestuiving / eiwitgehalte / kolfopbrengst              | 2 l/ha vanaf 4-bladstadium                                                                                   |
| Suikerbiet         | suikergehalte / voorkomen hartrot                                     | 1-2x 2-3 l/ha vanaf 6-bladstadium                                                                            |
| Aardbei            | suikergehalte / inwendige kwaliteit / groei.                          | 1-2x 1 l/ha vanaf groene knopstadium                                                                         |
|                    | bloei kwaliteit / vruchtzetting                                       | 2 l/ha in de nazomer op de wachtbedden en bij overblijvende gewassen na de pluk maar voor de bladverkleuring |
| Pitfruit           | bloei / stuifmeelkieming / zetting / schilkwiteit / calciumverzorging | 1-2x 1 l/ha vanaf begin van de boei.                                                                         |
| Steenfruit         | bloei / vruchtzetting / calciumverzorging                             | 1-2x 1 l/ha vanaf begin van de boei.                                                                         |
| Bessen             | bloei / stuifmeelkieming / zetting / schilkwiteit / calciumverzorging | 1-2x 1 l/ha voor de bloei.                                                                                   |
| Bloembollen        | sortering / inwendige kwaliteit / bolaantal / groeipunten             | 1-2x 3 l/ha vanaf 10-15 cm gewaslengte.                                                                      |
| Kool, bladgroenten | groeipunten / inw. kwaliteit                                          | 2-3x 2-3 l/ha vanaf voldoende bladmassa                                                                      |
| Asperges           | kwaliteit, huidkwaliteit                                              | 2-3x 2-3 l/ha vanaf voldoende bladmassa                                                                      |

## Opmerking