

Thiotrac

Vloeibare bladmeststof ter aanvulling van de zwavelbehoefte

Productsoort	EG-meststof
Type aanduiding	N meststof oplossing met zwavel
Fysische toestand	Vloeistof
Samenstelling	15,2% stikstof, 200 g/l N + 24,8% zwavel, 326 g/l S
Soortelijk gewicht	1,32 kg/l
Kleur	Rood
pH	8,0 – 9,0
UN nummer	Geen
Transportgevarenklasse(n)	Geen
Opslag	Vorstvrij
Verpakking	10 liter

YaraVita Thiotrac is een zeer geschikte zwavelmeststof omdat het in tegenstelling tot elementair zwavel direct opgenomen kan worden. Een gerichte bespuiting met Thiotrac 300 zorgt voor een hoger eiwitgehalte in granen en een hoger olie-gehalte in oliehoudende gewassen.

Voordelen

- ✓ Goed opneembaar door het blad
- ✓ Zeer hoge gewasveiligheid
- ✓ Mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen

Advies

Koolzaad	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking / oliesynthese	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking / oliesynthese
Kool	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha 2 tot 3 weken na het planten. Eventueel herhalen.
Prei	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha bij 20-25 cm gewaslengte. Eventueel herhalen.
Wortelen	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha bij 20-25 cm gewaslengte. Eventueel herhalen.
Bonen / Erwten	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha in het 4-6 bladstadium. Bij matig tot ernstige gebreken, interval van 10-14 dagen herhalen.

Aardappelen	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha bij het sluiten in de rij. Eventueel herhalen.
Graan	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha tussen begin stengelstrekking en eerste knoop. Eventueel herhalen.
Uien	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	5 l/ha 2 tot 3 weken na het planten. Eventueel herhalen.
Lelies (open teelt)	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking	Lelies (open teelten): 5 l/ha vanaf 25 cm gewaslengte. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen. interval van 10 tot 15 dagen. Niet tijdens de bloei bespuiten
Overige gewassen	Productie eiwitten en amino-zuren / stikstofverwerking / zwavelgebrek	5 l/ha. Eventueel herhalen.