

Bortrac 150

Algemeen



Bortrac 150

Best tankmengbare borium bladmeststof

Borium is een kwaliteitselement. Het zorgt ervoor dat voedingsstoffen zich in de plant makkelijker kunnen verplaatsen. Daardoor is het belangrijk voor bijvoorbeeld het suikergehalte in suikerbieten. Daarnaast zorgt borium voor een goede kieming van het stuifmeel. Denk daarbij aan zetting in fruitteelt-gewassen of in maïs.

Tekorten:

Veel gronden, zeker de lichtere zandgronden hebben over het algemeen een lage borium-bodemvoorraad waardoor een bemesting noodzakelijk is. Ook een te hoge pH of te hoge stikstofgiften maken een boriumbemesting noodzakelijk.

Vroege toepassing:

Op het moment dat de plant borium nodig heeft is het gewas nog erg klein. Alleen de borium die dicht bij de wortels ligt kan worden opgenomen. De meest efficiënte manier van bemesting is dan bladbemesting. De borium is direct beschikbaar, spoelt niet uit en kan ook niet worden vastgelegd in de bodem. Met bladbemesting worden ook eventuele opnameproblemen door droogte omzeilt. Het vroege bemestingstijdstip zorgt ervoor dat een deel van de borium naast de plant wordt gespoten. Onderzoek heeft echter aangetoond dat latere toepassingen veel minder effectief en rendabel zijn.

Voordelen Bortrac 150:

- Zeer hoge gewasveiligheid
- Zeer brede tank-mengbaarheid
- Zeer goede opname
- Vloeibaar
- 150 g/l B
- Verpakking : 10 en 210 liter

Overige eigenschappen:

pH-buffering: Aminosuren bevatten organisch materiaal dat een overmaat aan H⁺ en OH⁻ inonen bindt. Dat wil zeggen dat bij voldoende Aminosol de spuitvloeistof zich zal stabiliseren rond pH 5,5 à 6.
Reuk: Bij afbraak van aminosuren ontstaan sterk ruikende verbindingen die door harig wild intensief worden waargenomen.

Advies:

Zie andere zijde.



Bortrac 150

Algemeen

Advies:

Pitvruchten:

2 l/ha na de oogst, maar voor de bladval + 2 x 1 l/ha vanaf groene knop tot ballonstadium + 1 l/ha in de nabloei.

Aardbei:

1 l/ha in het witte knopstadium + na 10 dagen herhalen.

Suikerbieten, koolsoorten, mais, bloembollen:

3 l/ha bij de onkruidbestrijding. Eventueel herhalen.

Aardappelen, uien, wortelen, peulvruchten:

2 l/ha bij 100% opkomst. Eventueel herhalen.

Bortrac 150 is zeer goed tankmengbaar. Zie www.tankmix.com

