

Stimplex



Mengbaar:

Bevordert celdeling
Verhoogt aantal vruchten / knollen
Betere sortering / uniformiteit
Betere beworteling
Vitaler gewas / minder stress en minder vatbaar voor ziekten

Verpakking:

10 liter

Advies:

APPEL / PEER:

Ter bevordering van de zetting, vruchtmaat, stevigheid en een hogere opbrengst. 4 x 1,5 à 3,5 l/ha. Groene knop + roze/witte knop + tijdens de bloei + begin vruchtontwikkeling.

KERS / PRUIM:

Ter bevordering van de zetting, vruchtmaat, stevigheid en een hogere opbrengst. 4 x 1,5 à 3,5 l/ha. Roze/witte knop + tijdens de bloei + begin vruchtontwikkeling + na drie weken.

KLEINFRUIT / AARDBEI:

Ter bevordering van de groei, uitloop, zetting en voor een hogere opbrengst. 3 x 2 l/ha. Groene knop + tweemaal herhalen met interval van 7 dagen. Aardbeien op substraat: 2 x 3 l/ha. Een week na planten en na 7 dagen herhalen.

Stimplex

Vloeibare meststof op basis van zeewierextract, ook geschikt voor de biologische teelt

Stimplex is een extract van *ascophyllum nodosum*, een zeer hoogwaardige zeewiersoort. Doordat Stimplex de aanmaak van het celdelingshormoon cytokinine stimuleert, bevordert het de celdeling. Stimplex is specifiek geformuleerd voor gebruik als bladmeststof in de land- en tuinbouw. Stimplex kan worden toegepast via bladbemesting of druppelirrigatie.

Functie:

- Het hormoon cytokinine is het celdelingshormoon. Samen met de voedingsstoffen bevordert Stimplex de celdeling en daarmee de groei, vruchtmaat en opbrengst.
- Stimplex zorgt tevens voor extra stevige celmembranen en daardoor voor stevigere vruchten.
- Bij toepassingen laat in het seizoen kan de afrijping worden vertraagd waardoor de vruchten meer tijd hebben om te groeien.



BESSEN:

Ter bevordering van de groei, uitloop, zetting en voor een hogere opbrengst. 2 x 3 l/ha. 2 weken voor de bloei + 2 weken na val bloemblad.

AARDAPPEL:

Ter bevordering van de zetting, verhoging van het aantal knollen. 3 x 3 l/ha. 1e x 10-14 dagen voor knolzetting + 2 maal herhalen met interval 7-10 dagen.

BOOMKWEKERIJ / SIERTEELT:

Voor betere vertakking door opheffing van de apicale dominantie en betere uitloop. 2 x 5 l/ha. Altijd een uitvloeier toevoegen. Vanaf voldoende bladoppervlak 5 l/ha. (Bij Malus 9 volgroeide bladeren). Na 14 dagen herhalen.

TOMAAT / PAPRIKA / KOMKOMMER:

Ter bevordering van de groei, zetting en voor een hogere opbrengst. 3 x 3 l/ha. Bij 15-20 cm gewaslengte + bij begin bloei + begin vruchtzetting. Voor betere beworteling 2 x 3 l/ha. Een week na planten en na 7 dagen herhalen.