

Hydromag 500

Zeer efficiënte magnesium bladmeststof

Productsoort	EG-Meststof
Type aanduiding	Suspensie van magnesiumhydroxide
Fysische toestand	Vloeistof
Samenstelling	33% magnesiumoxide, 500 g/l MgO
Soortelijk gewicht	1,51 kg/l
Kleur	Lichtbruin
pH	9,8
UN nummer	Geen
Transportgevarenklasse(n)	Geen
Opslag	Vorstvrij
Verpakking	10 liter

YaraVita Hydromag 500 is de enige magnesiummeststof waarmee op een makkelijke manier, zonder problemen een magnesium bladbemesting kan worden uitgevoerd. De formulering als flowable zorgt ervoor dat met minder magnesium hetzelfde resultaat wordt behaald als met bijvoorbeeld bitterzout (magnesiumsulfaat) en/of magnesiumnitraat. Daarom is Hydromag 500 uitermate geschikt voor aanvulling op bodembemesting en het snel opheffen van gebreksymptomen.

Voordelen

- ✓ Zeer effectief
- ✓ Zeer hoge gewasveiligheid
- ✓ Brede tank-mengbaarheid

Voordelen

Zie tabel op volgende pagina

Advies

Appel	Bladkwaliteit / fotosynthese / voorkomen vroegtijdige bladval	4 l/ha. Vanaf direct na de bloei. 3 tot 4 keer herhalen met interval van 14 dagen. Op gevoelige percelen na de pluk 2 l/ha.
Peer	Bladkwaliteit / fotosynthese / voorkomen vroegtijdige bladval	4 l/ha. Vanaf direct na de bloei. 2 tot 3 keer herhalen met interval van 14 dagen. Op gevoelige percelen na de pluk 2 l/ha.
Steenfruit	Bladkwaliteit / fotosynthese / voorkomen vroegtijdige bladval	4 l/ha tijdens de vruchtzetting en na 14 dagen herhalen.
Bessen	Bladkwaliteit / fotosynthese / voorkomen vroegtijdige bladval	4 l/ha aan het begin van de bloei en nogmaals bij 100% vruchtzetting.
Aardbeien	Bladkwaliteit / fotosynthese / voorkomen vroegtijdige bladval	4 l/ha in het groene knopstadium en nogmaals aan het einde van de bloei.
Aardappel	Bladkwaliteit / fotosynthese	4 l/ha bij het sluiten in de rijen. Eventueel na 14 dagen herhalen. Op gevoelige rassen standaard 2 toepassingen.
Bloembollen	Bladkwaliteit / fotosynthese	4 l/ha bij 20-25 cm gewaslengte. Eventueel na 14 dagen herhalen. Na het koppen nogmaals 4 l/ha.
Graan	Bladkwaliteit / fotosynthese	4 l/ha tussen 2-bladstadium en eerste knoop. Eventueel na 14 dagen herhalen.
Suikerbieten	Bladkwaliteit / fotosynthese	4 l/ha vanaf het 4-6 bladstadium. Herhalen na 14 dagen.
Wortelen	Bladkwaliteit / fotosynthese	4 l/ha vanaf het 4-bladstadium. Herhalen na 14 dagen.
Overige gewassen	Bladkwaliteit / fotosynthese / voorkomen vroegtijdige bladval	1 à 2 keer 4 l/ha

Opmerking

Magnesium kan het beste enkele hogo deseringen worden bemest. Veel kleine toepassingen met, een lage dosering zijn minder effectief. Magnesium wordt eenvoudig door de plant getransporteerd.