

# Avitar – 3x raak!

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productsoort              | Meststof                                                                                                                                                                            |
| Type aanduiding           | Organische NK meststof met Aminosol, zeewier en humine- en fulvine-zuren                                                                                                            |
| Fysische toestand         | Vloeistof                                                                                                                                                                           |
| Samenstelling             | bevat 40 % aminozuren, 40% zeewierextract (Ascophyllum nodosum en 20% humine- en fulvinezuren. Bevat 4,1% totaal stikstof (47 g/l N) en 2,1% kalium-oxide (24 g/l K <sub>2</sub> O) |
| Soortelijk gewicht        | 1,15 kg/l                                                                                                                                                                           |
| Kleur                     | Zwart                                                                                                                                                                               |
| pH                        | 9,0                                                                                                                                                                                 |
| UN nummer                 | Geen                                                                                                                                                                                |
| Transportgevarenklasse(n) | Geen                                                                                                                                                                                |
| Opslag                    | tussen -5 °C en 35 °C                                                                                                                                                               |
| Verpakking                | 10 liter                                                                                                                                                                            |

Avitar bevat een unieke combinatie van drie interessante ingrediënten: aminozuren, zeewierextract (Ascophyllum nodosum) en humine- en fulvinezuren. Avitar helpt om de negatieve gevolgen van abiotische stress te verminderen (nat, droogte, straling en hitte) maar ook stress als gevolg van de groeistadia in planten wordt verlaagd (bijvoorbeeld tijdens knolzetting in aardappelen).

Daarnaast zorgt Avitar voor een betere opname van nutriënten, met tal van positieve planteffecten tot gevolg. Avitar mag in Nederland en België worden toegepast in de biologische landbouw, volgens de huidige EU-wetgeving, gecontroleerd door Skal inputlijst en TÜV-NORD INTEGRA.

## Voordelen

- ✓ Verhoging stresstolerantie
- ✓ Betere opname van voedingselementen
- ✓ Vitaler gewas
- ✓ Meer opbrengst
- ✓ Betere kleuring van fruit

## Advies

Zie tabel op volgende pagina

# Advies

| Gewas | Doel/probleem | Advies | Tijdstip |
|-------|---------------|--------|----------|
|-------|---------------|--------|----------|

**Gewassen met een tekort aan voedingsstoffen zullen vatbaarder zijn voor ziekten en abiotische stress. Bladbemesting met macro- en micro-elementen zorgt voor een optimale plantvoeding**

|                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| In alle gewassen     | Voor stevigheid celwand, vermindering van stress door UV-straling (antioxidant), verbetering fruitkwaliteit en bewaarbaarheid<br>Vitaliteit, stevigheid stengel<br>Knol- en schilkwaliteit, verbetering bewaarbaarheid | 1 – 6 keer 2 – 6 l/ha<br>(voor bladtoepassing met minimaal 200 ltr water/ha. Niet tijdens de bloei!) | Indien nodig                              |
| Granen               | Vitaliteit, stevigheid stengel                                                                                                                                                                                         | 2 – 4 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Vanaf begin uitstoeling                   |
| Aardappelen          | Knol- en schilkwaliteit, verbetering bewaarbaarheid                                                                                                                                                                    | 2 – 4 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Bij de start van het sluiten van de rijen |
| Suikerbieten         | Kwaliteit, betere bewaarbaarheid en transport                                                                                                                                                                          | 1 – 2 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Vanaf het 6 bladstadium                   |
| Maïs                 | Vitaliteit, stevigheid                                                                                                                                                                                                 | 1 – 2 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Vanaf 4 bladstadium                       |
| Vollegronds-groenten | Vitaliteit betere bewaarbaarheid                                                                                                                                                                                       | 2 – 4 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Bij voldoende bladmassa                   |
| Pitfruit             | Vitaliteit, hardheid vruchten, betere bewaarbaarheid en transport                                                                                                                                                      | 3 – 4 keer 4 – 6 l/ha                                                                                | Na de bloei vanaf BBCH 69                 |
| Steenfruit           | Vitaliteit, hardheid vruchten, betere bewaarbaarheid en transport                                                                                                                                                      | 2 – 3 keer 3 – 5 l/ha                                                                                | Vanaf begin bloei                         |
| Bessen               | Vitaliteit, kwaliteit, betere bewaarbaarheid en transport                                                                                                                                                              | 2 – 3 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Indien nodig                              |
| Aardbeien            | Vitaliteit, hardheid vruchten, betere bewaarbaarheid en transport                                                                                                                                                      | 2 – 4 keer 2 – 4 l/ha                                                                                | Vanaf vruchtvorming                       |