

Combi-Protec®- Verleidt Suzuki-fruitvliegen en bestrijdt efficiënt

Productsoort	Toevoegingsstof, toegelaten onder nummer 14919 N
Type aanduiding	Lokstof op basis van eiwitten die de opname van insecticiden verbetert
Fysische toestand	Vloeistof
Samenstelling	Lokstof op basis van eiwitten die de opname van insecticiden verbetert
Soortelijk gewicht	1,3 – 1,4 kg/ltr
Kleur	Geel- tot donkerbruin
pH	5 - 6
UN nummer	Geen
Transportgevarenklasse(n)	Geen
Opslag	Vorstvrij
Verpakking	5 liter

Combi-Protec wordt als hulpstof direct aan de spuitoplossing toegevoegd. Combi-Protec heeft zelf geen insecticide werking. Combi-Protec mag in Nederland worden gebruikt in de biologische landbouw, volgens de huidige EU-wetgeving, gecontroleerd door Skal inputlijst.

Voordelen

- ✓ Verbeteren effectiviteit van (verlaagde doseringen) insecticiden.
- ✓ Minder residu
- ✓ Toepasbaar in de biologische teelt
- ✓ Geen effect op nuttigen
- ✓ Besparing op kosten door veel minder middel

Advies

Het aantal toegelaten insecticiden wordt snel minder, het is daarom raadzaam aan een insecticide toepassing tegen de Suzuki fruitvlieg altijd Combi-Protec toe te voegen om de effectiviteit te verhogen. Combi-Protec is niet beperkt in het aantal toepassingen of het interval, maar insecticiden zijn dat wel, let daar goed op.

Bij een volledige gewasbespuiting 1 L per hectare gebruiken op 400 L water. Als een gedeeltelijk boombespuiting wordt gedaan, dan 1 L Combi-Protec per 20 L water. Hiervoor is een specifieke spuittechniek noodzakelijk. Ook kan in sommige gevallen een verlaagde dosering insecticide gebruikt worden. Informeer hiervoor bij uw leverancier.

Opmerkingen

Vul de spuittank voor 3/4 met water en begin met roeren. Voeg de verlaagde dosering insecticide bij en daarna Combi-Protec. Blijf goed roeren. Spuit op een droog gewas. Spuitinterval: 5 – 7 dagen.