

Optitrac

Extract uit *Ascophyllum nodosum*, borium, zink: voorkomt stress

Productsoort	EG-Meststof
Type aanduiding	Mengsel van spoorelementen borium (B), zink (Zn) en bevat ook zeewierextract
Fysische toestand	Vloeistof, suspensie concentraat (SC)
Samenstelling	1,1% borium, 13 g/l B en 1,1% zink, 13 g/l Zn Bevat ook: 17% Org stof (zeewier-/algenextract) + 5,6% N + 2,3% K ₂ O
Soortelijk gewicht	1,17 kg/l
Kleur	Donkergroen-Bruin
pH	7,0 - 8,0
UN nummer	3082
Transportgevarenklasse(n)	9
Opslag	Vorstvrij
Verpakking	10 liter

In YaraVita Optitrac zit een zeewierextract, verrijkt met borium en zink. Dat maakt uw gewas weerbaarder en biedt de noodzakelijke ondersteuning in situaties van stress. Het heeft een positieve invloed bij extreme temperaturen, droogte en behandelingen met herbiciden. Het helpt jonge planten om zich beter te ontwikkelen.

Voordelen

- ✓ Verbetert de opname van voedingsstoffen
- ✓ Geeft voeding aan het gewas
- ✓ Stimuleert wortelgroei
- ✓ Vermindert stress, verhoogt de opbrengt

Advies

Zie tabel op volgende pagina

Advies

Aardbeien (volle grond)	Bij het verschijnen van de groene knop	3 l/ha herhalen bij bloei en na 10 - 14 dgn
Aardappelen	7 - 14 dagen na 100% opkomst	3 l/ha 3 tot 4 keer met een interval van 7-10 dagen
Appels en Peren	Voor bloei, tijdens de bloei en na het vallen van de bloemblaadjes	3 l/ha, 3 keer
Bosbessen	Begin bloei, volle bloei en vruchtzetting en bij perioden van stress	2 - 3 l/ha 3 keer
Koolsoorten	Vanaf 4- tot 6- bladstadium	1-2 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen
Komkommer	Vanaf 4- tot 6- bladstadium	3 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen
Paprika	Vanaf 4- tot 6- bladstadium	3 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen
Sla	Vanaf 4- tot 6- bladstadium	3 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen
Tomaat	Vanaf 4- tot 6- bladstadium	3 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen
Uien	Vanaf 4- tot 6- bladstadium	3 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen
Wortelen	Vanaf gewashoogte 15 cm	2-3 l/ha 3 keer met een interval van 10 tot 14 dagen

Opmerking

Fertigatie mogelijk maar niet gebruiken bij gesloten of recirculatie systemen en niet gebruiken bij in potten of containers geteelde planten. Onmiddellijk na toepassing het systeem grondig doorspoelen met water.