

AVISTIM IN DRUIVEN

DRIE JAAR OP RIJ EEN HOGERE OPBRENGST MET AVISTIM

Meerjarig effect van AviStim op de opbrengst in druiventeelt
(2003–2005)

Object:

4 x 4 L/ha AviStim

Toepassing:

Bladtoepassing in juni
en juli

Gemeten:

Opbrengst, gemeten
over 3 opeenvolgende
seizoenen

+8,7%

Meeropbrengst in 2003

+6,9%

Meeropbrengst in 2004

+7,6%

Meeropbrengst in 2005

Resultaat: opbrengst per jaar

Object	Opbr. 2003	Opbr. 2004	Opbr. 2005
Onbehandeld	205,4	278,5	128,0
AviStim 4 x 4 L/ha	223,3	297,6	137,7
Relatief (%)	108,7	106,9	107,6



Conclusie:

Over drie opeenvolgende seizoenen (2003, 2004 en 2005) zorgt de toepassing van 4 x 4 L/ha AviStim in druiven steeds voor een hogere opbrengst dan onbehandeld: een meeropbrengst van 6,9 tot 8,7% per jaar. Het effect van AviStim op de opbrengst is daarmee consistent en meerjarig aangetoond.

Advies:

4 x 4 L/ha AviStim als bladtoepassing in juni en juli.